

ALERTE DIPHTÉRIE - FLASH INFO

La diphtérie cutanée est une infection bactérienne qui se transmet principalement par contact direct avec les plaies ou les lésions cutanées d'une personne infectée ou par contact avec des objets souillés (literie, vêtements, pansements).

- **Vaccination:** La vaccination diphtérique reste la meilleure protection. Assurez-vous d'être en ordre de vaccination (vaccin dans les 10 dernières années pour la diphtérie- (même vaccin que celui du tétanos : Boostrix, Triaxis)
- **Protection :** L'absence de contact direct avec les plaies ou les sécrétions (en particulier les pansements souillés) préserve généralement l'entourage, limitant le risque de transmission indirecte qui est rare.
- **Risque professionnel:** Les travailleurs du soin sont les plus exposés et doivent appliquer des précautions "contact" standard en manipulant les lésions ou en changeant les pansements.

Quand un soin est prodigué, systématiquement utiliser des gants et porter un masque, en veillant à ensuite bien recouvrir la plaie par un pansement occlusif.

Quand les affaires personnelles de personnes à risque (personnes présentant de plaies) sont manipulées, systématiquement porter des gants et un masque.

- Hygiène : Un lavage de mains rigoureux est la mesure de protection la plus efficace après la vaccination.

Que faire dans mon contact avec le public aidé ?

- Dans la mesure du possible, vérifier l'état de vaccination de la personne
- En cas de suspicion de diphtérie cutanée (plaie douloureuse ou paraissant infectée), orienter vers l'Hôpital St-Pierre pour un frottis
- Pour les groupes à risque (personnes présentant des plaies et personnes qui s'injectent des produits en intraveineuse), orienter et accompagner vers les points de vaccination mobiles (voir infra)

Plus d'infos? Consultez le courrier de Vivalis destiné aux acteurs de terrain : [Diphtérie - courrier acteurs de terrain FR.docx](#)